BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

DIFENYLCYCLOPROPENON 0,001 – 2 % APPLICATIEVLOEISTOF

Versie: 2.0 Datum laatste herziening: 17-11-2022 Artikelnummer: 2405598
2405601
2405628
2405636
2405644
2405652

Werking en toepassingen

Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?
Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij pleksgewijze haaruitval (*alopecia areata*) bij meer dan 50% kaalheid van de hoofdhuid of wanneer andere therapieën onvoldoende effect geven.
Ook wordt dit geneesmiddel gebruikt bij therapieresistente wratten.

Bijwerkingen

Op welke bijwerkingen moet ik letten?
De belangrijkste bijwerkingen zijn:

- Sterke allergische reacties
- Galbulten, jeukende bulten op de huid(*urticaria*)
- Blaarvorming
- Pigmentvlekken op de huid
- Eczeem
- Opgezette lymfeklieren

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

U kunt bijwerkingen melden bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe, wanneer en hoe lang?

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?
Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van het geneesmiddel.

Hoe?
Let op: diphenylcyclopropenon is een zeer sterk sensibiliserende stof.
Gebruik altijd een wattenstaafje voor het aanbrengen van diphenylcyclopropenon en breng dit geneesmiddel nooit aan met behulp van uw blote handen of vingers. Draag wegwerp handschoenen bij openen van de flacon en aanbrengen van de vloeistof.

De behandeling begint met sensibilisatie van de huid door met een wattenstaafje aanbrengen van de oplossing difenylcyclopropenon 20 mg/ml op een klein gedeelte van de hoofdhuid (bij alopecia areata) of binnenkant van de bovenarm (bij therapieresistente wratten).

Wanneer?
Alopecia areata: 1x per week een helft van de hoofdhuid behandelen met 0,001 of 0,01 mg/ml.

Raadpleeg altijd BizzMine voor de meest actuele en geldige versie.

Op basis van de respons wordt de concentratie vervolgens door uw arts stapsgewijs verhoogd tot maximaal 20 mg/ml. Vanaf het moment dat de optimale concentratie gevonden is kan de gehele hoofdhuid worden behandeld.

Therapieresistente wratten: Op basis van de respons zal uw arts zal bepalen welke sterkte diphenylcyclopropenon en hoe vaak het middel gebruikt dient te worden.

Hoe lang?
Alopecia areata: Uw arts zal u vertellen hoe lang u dit middel moet gebruiken.
De behandeling wordt voortgezet tot volledige haargroei optreedt (meestal na 6 maanden) en de hoeveelheid haar vervolgens 3 maanden stabiel blijft. Daarna wordt stapsgewijs de concentratie afgebouwd in ongeveer 9 maanden.

Therapieresistente wratten: Uw arts zal u vertellen hoe lang u dit middel moet gebruiken. U moet dit medicijn zolang als nodig is gebruiken. Als u geen verbetering ziet, moet u contact opnemen met de arts.

Dosis vergeten of te veel gebruikt?
Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?
Het is belangrijk dit medicijn consequent aanbrengt. Mocht u toch een dosis vergeten zijn: breng deze dan zo snel mogelijk alsnog aan, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis.

Wat moet ik doen als ik te veel heb gebruikt?
Wanneer u te veel hebt aangebracht, spoel dit af met veel water. Neem contact op met uw arts of apotheker.

Autorijden, alcoholdrank, voeding
Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan autorijden?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan alcohol drinken?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Wisselwerking
Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?
Smeer andere huidmiddelen niet tegelijkertijd op de aangedane plekken. U heeft dan kans dat u dit medicijn met het volgende wegsmeert.

Twijfelt u eraan of deze wisselwerking / wisselwerkingen voor u van belang is / zijn? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Zwangerschap en borstvoeding
Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben of wil worden?
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Normaalgesproken zal uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik van diphenylcyclopropenon voordat u zwanger bent of zodra u weet dat u zwanger bent en uw arts zal u adviseren een ander geneesmiddel te gebruiken in plaats van diphenylcyclopropenon.

Kan ik medicijn gebruiken als ik borstvoeding geef?

Raadpleeg altijd BizzMine voor de meest actuele en geldige versie.

Vertel uw arts als u borstvoeding geeft. Diphenylcyclopropenon wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven en uw arts kan kiezen voor een andere behandeling als u borstvoeding wenst te geven, vooral als uw baby pas is geboren of te vroeg is geboren.

Wanneer niet gebruiken?

Wanneer mag ik dit medicijn niet gebruiken?
U mag dit middel niet gebruiken, als u allergisch bent voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. De stoffen kunt u vinden onder de rubriek 'Samenstelling'.

U bent zwanger, denkt zwanger te zijn, wil zwanger worden of geeft borstvoeding.

Toepassing bij kinderen jonger dan 12 jaar wordt ontraden.

Neem contact op met uw arts als u last heeft van contra-indicatie.

Stoppen

Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?
U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen.

Samenstelling

Wat zit er in dit medicijn?
Difenylcyclopropenon 0,001 - 2% applicatiebloeistof bevat per ml 0,1 – 2 mg difenylcyclopropenon.
Verder bevat de applicatievloeistof aceton.

Bewaren

Hoe moet ik het medicijn bewaren?
LET OP: uit de buurt houden van open vuur en warmtebronnen.
Bewaar de applicatievloeistof in de koelkast (2-8 °C).
Sluit na gebruik de flacon goed af. Dit voorkomt dat het oplosmiddel (aceton) verdampt.
Bewaar de flacon rechtopstaand.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Deze is vermeld op het etiket.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij uw apotheker.

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door de A+ Apotheek. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is A+ Apotheek niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Raadpleeg altijd BizzMine voor de meest actuele en geldige versie.